



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации пестицида или агрохимиката**

№ 1803

от « 03 » марта 2010г

Настоящее свидетельство выдано ЗАО Фирма «Август», 1025006038958
(наименование организации, ОГРН,

ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. №109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Ордан, СП (689 г/кг меди хлорокись + 42 г/кг цимоксанила)
(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 1803-10-107-003-0-1-2-1
на срок по « 02 » марта 2020 г. и допускается к обороту на территории Российской Федерации со следующими регламентами:

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата, кг/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
2-2,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое до смыкания ботвы в рядах или не позднее двух суток после инфицирования растений, последующие с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости - 400 л/га	20(3)
2,5-3	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее двух суток после инфицирования растений, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 600 л/га	5(3)
	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз		
	Огурец защищенного грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее двух суток после инфицирования растений, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м ²	3(3)
	Томат защищенного грунта	Фитофтороз, альтернариоз		
	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости - 1000 л/га	20(3)

Для личных подсобных хозяйств:

Норма применения препарата	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
25 г/5 л воды	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое до смыкания ботвы в рядах или не позднее двух суток после инфицирования растений, последующие с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м ²	20(3)

1	2	3	4	5
25 г/5 л воды	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее двух суток после инфицирования растений, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 5 л/100м ²	5(3)
	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз		
25 г/8 л воды	Огурец защищенного грунта	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее двух суток после инфицирования растений, последующие с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 8 л/100м ²	3(3)
	Томат защищенного грунта	Фитофтороз, альтернариоз		

Сроки выхода на обработанные площади в условиях сельского хозяйства для проведения ручных работ (в том числе в личных подсобных хозяйствах) – 7 дней, механизированных – 3 дня. Сроки выхода на обработанные площади в условиях сельского хозяйства (защищенный грунт) для проведения ручных работ, в том числе личных подсобных хозяйствах – 3 дня.

Запрещено применение препарата: в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов; авиационным методом.



Заместитель Руководителя Россельхознадзора

(подпись)

А.И. Саурин
(Ф.И.О.)

М.П.